







Quel Abord en l'absence de veine superficielle ?

Lamisse KARAM (Hotel Dieu de France,
Beyrouth – Liban)

Pierre BOURQUELOT (Paris – France)

***Pas de conflits
d'intérêts***

La Technique



Les chiffres

AUTEUR	DATE	PATIENTS	2 TEMPS	TYPE D'ETUDE	RESULTATS
Dorabantu	2006	33	Oui	Réistropective	Perméabilité globale de 85% à 3-26 mois
Stembengh	2008	42	Non	Réistropective: basilique vs BVT	40% des fav fonctionnelles à 1 an comparable à la FAV basilique
Angle	2008	42	Souvent	Réistropective BVT vs AVG	BVT > AVG
Jennings	2009	58	45	Rétrospective	92.4% Perméabilité cumulative de 92.4% à 1 an et 2 ans
Karam	2018	64	63	Rétrospective	Perméabilitê secondaire à 1an: 60% Perméabilité secondaire fonctionelle à 1 an: 91%

Nos Chiffres

1ère
étape


- 64 patients

2ème
étape


- 50 patients

canulation

- 40 patients




SÉLECTIONNER LES PATIENTS



Sélectionner les patients

#1: Vérifier les ATCD


#2: Echo doppler Artériel et Veineux des membres




#3: Phlébographie Systématique

#4: microchirurgie


**Examen Ultrasonographique
de 64 membres supérieurs**




**- Brachial Artery Bifurcation
level -**




Examen Ultrasonographique de 64 membres supérieurs



Examen Ultrasonographique de 64 membres supérieurs



Examen Ultrasonographique de 64 membres supérieurs








Quel Abord en l'absence de veine superficielle ?

Lamisse KARAM (Hotel Dieu de France,
Beyrouth – Liban)

Pierre BOURQUELOT (Paris – France)



**LA BRACHIO-BRACHIALE
ÉVIDEMMENT !**

Merci pour votre attention!