Reste-t-il une Place en France pour les PTFE ?

Dr Sabrina BEN AHMED

SFAV – JUIN 2024

INTRODUCTION

PTFE = polytétrafluoroéthylène

Substitut Vasculaire Synthétique

- ePTFE = PTFE expansé +++
- Polymère thermoplastique : stable à des températures élevées
 - structures tubulaires microporeuses
- **Grande inertie chimique** : capacité à résister à différents types d'agressions chimiques liquides ou gazeuses

ePTFE

Substitut Vasculaire Synthétique

- Utilisé depuis > 40 ans
- Matériel synthétique de référence / + couramment utilisé
 - Tétrafluoroéthylène (Dacron*) / Polyuréthane
 - perméabilité <, saignements >, fragilité de paroi
 - Ø Marque
- **Avantages**
 - Chirurgie rapide / peu de complication peri-opératoire
 - Sous AL avec ou sans sédation
 - Facilement palpable et facilement ponctionnable

ePTFE : polytétrafluoroéthylène expansé

- Prothèses ePTFE « classiques »
- Prothèses à ponction rapide , spécialement créés pour l'hémodialyse
- **Avantages :**
 - Biocompatible, stabilité à long terme
 - Pls couches de densité et propriétés variables
 - Limitent le suintement perop et saignement au retrait de l'aiguille
 - Canulation précoce sans risque
 - Perméabilité et complications comparables aux PTFE classiques

Al Shakarchi et al. JVS 2019

- Mais dommages liés aux ponctions

FLIXENE® GETINGE

3 jours

ACUSEAL GORE®

24 h

Stegmayret al. IJAO 2021

RESULTATS

PERMEABILITE

- **Court-terme** : Bonne perméabilité
- **Long-terme** :
 - **Sténose / occlusion** : hyperplasie myointimale progressive – sténoses au site d'anastomose veineuse
 - **Perméabilité à 1an** :
 - primaire 40-50% / secondaire 70 – 90%
 - **Perméabilité à 2 ans** :
 - primaire : 20 – 30 % / secondaire 50 -70 %
 - Après 2 ans, 50% non fonctionnelles
 - Multiples réinterventions
 - Peu adaptées aux patients jeunes

INFECTION

- x 4 / FAV natives
- MI > MS
- **Prévention** :
 - Antibioprophylaxie per-operatoire (anti staphylococcique)

DE PLUS: risques liés au remplacement de prothèses : complications hémorragiques et infectieuses

Stegmayret al. IJAO 2021

COMPLICATIONS VASCULAIRES

- Debit élevé / faible résistance
 - Main : sd de vol vasculaire
 - HTAP, Insuffisance cardiaque

AMELIORATIONS DES PTFE

- Pour réduire complications, plusieurs modifications ont été étudiées
 - Élasticité : PTFE stretch
 - Cuff veineuse
 - Epaisseur : PTFE fin
 - Héparine en surface
 - Modification de la paroi externe : renforcée par des anneaux
 - Limiter turbulences : Diamètres progressifs : 4 à 7 mm / 6 à 8 mm

ePTFE

Paroi fine vs Paroi standard

- Epaisseur standard : 0,64 mm
- Epaisseur fine : 0.37 mm
- Paroi fine = plus flexible / facilement maniable
- Etude *Lenz et al. JVS 1998* / 108 patients - 3 ans de suivi
 - Perméabilité Ire : standard > fine (18.2 versus 12.1 months)
 - Perméabilité IIre : standard > fine (20.9 versus 13.7 months)

PAROI STANDARD > PAROI FINE

ePTFE

Paroi héparinée

- Introduction en 2006
- **Avantages** : améliorer biocompatibilité / moins d'adhésion & activation plaquettaire / moins d'inflammation
 - théoriquement semble avantageux
 - Perméabilités à 1 an et 2 ans comparables
 - Taux de complications comparables
- Peu de risque : thrombocytopénie / héparine 0.1%

PAS DE REEL BENEFICE

ePTFE

Paroi renforcée

- **Anneaux externes pour :**

- Résister aux plicatures
- Résister aux compressions

- **Asie / ø EU / ø Europe**

- Etudes Taiwanaises

- Résultats corrects : Pas de difficulté de ponction / Pas de complication hémorragique

Kao & Chang Asian Cardiovasc Thorac Ann 2003

- Etude rétrospective 4400 patients (990 ePTFE renforcés) :

- ePTFE renforcé : perméabilité à 1, 2 et 3 ans significativement >
- 49.4 versus 31.9 % 31.6 versus 17.4 % - 20.2 versus 10.8 %

Hung et al. Clin J Am Soc Nephrol 2010

NON DISPONIBLES

ePTFE

diamètres progressifs

- Diamètre classique ePTFE droit : 6 mm
- ePTFE diamètre progressif/ effilé
 - Côté artériel : plus petit diamètre
 - 4 à 6 ou 7 mm
 - Objectif théorique: réduire le débit => réduire les complications liées à hyperdébit
- Etude randomisée multicentrique (109 patients - *Dammers et al. JVS 2003*)
 - Perméabilité et resténose : équivalents
 - Sd vol et IC : équivalents
- Etude comparative (3608 patients dont 1473 évasées ePTFE – *Roberts et al. JVS 2019*)
 - Perméabilité / vol / réintervention : équivalents

PAS DE BENEFICE

ePTFE

anastomose veineuse renforcée par stenting en Nitinol

- **Principale complication** : sténose anastomotique veineuse / hyperplasie myointimale
- Renforcer anastomose veineuse par stent auto-expansible en nitinol sur ePTFE hépariné
 - Insertion par veinotomie
 - Pas de suture anastomotique, mais certains rajoutent qqs points pr sécuriser
- Etude comparative (50 patients - Benedetto et al. JVS 2017) / (25 patients - Anaya-Anal et al. JEVT 2015) / (363 patients - Benedetto et al. JVS 2019)
 - Perméabilité Ire / Ire assistée / Ilre : équivalents

PAS DE BENEFICE

AUTRES SUBSTITUTS VASCULAIRES

SUBSTITUTS VASCULAIRES BIOLOGIQUES

- **Veine Saphène**

- Paroi épaisse et pas de dilatation
- Diamètre souvent insuffisant
- Perméabilité décevante
- Temps de prélèvement / pb cicatrisation postop cuisse / réserver veine pour pontage périphérique ou coronarien futur

- **Veine fémorale**

- Diamètre et longueur adaptés
- Mais complications hémorragiques / Sd de vol

*Huber et al J Vasc Surg. 2004
Illig et al Cardiovasc Surg. 2002*

PEU UTILISEES

ALLOGREFFES

- **Allogreffes veineuses cryoconservées**
 - Bonne alternative si infection ePTFE
 - Perméabilité équivalente avec ePTFE
 - Taux de réinfection bas
 - ⚠ allo-immunisation / effet négatif sur future greffe rénale

Harlander-Locke et al J Vasc Surg. 2017
Jadlowiec et al. J Vasc Access 2016
Jadlowiec et al. Ann Vasc Surg 2015
Sadaghanloo et al. J Vasc Surg 2018

BON SUBSTITUT SI ePTFE INFECTE

XENOGRÉFFES

- Transplant vasculaire de l'animal vers le patient
- Tissus animaux chimiquement dénaturés pour éviter le rejet
- **Artère carotide bovine** : résultats variables / ePTFE
 - efficacité comparable aux prothèses
 - importante thrombogénicité et faible colonisation par les cellules hôte
- Etude contrôlée randomisée en cours

Katzman et al. J Am Coll Surg 2005
Kennealey et al J Vasc Surg. 2011
Ardhuise et al. J Vasc Surg 2017
Kotsakis et Koustopoulos JVA 2020

PAS DE RECOMMANDATION
PAS DE DISPONIBILITE EN FRANCE

SV issus de l'ingénierie médicale

- En cours de développement

Un échaffaudage / une matrice

- Synthétique
- Biologique
- Hybride

Des cellules :

- patient lui-même
- donneur même espèce
- donneur espèce différente

Des facteurs de croissance

Etapes

1. Prélèvement cellules
2. Culture = amplification et/ou différenciation
3. Ensemencement sur matrice
4. Maturation ds bioréacteur avec facteur de croissance
5. Implantation puis remodelage

Van Blitterswijk, Tissue Engineering, Joseph Bronzino series
Editor : Hartford, Connecticut USA. 2008

PROTHÈSES VASCULAIRES DÉCELLULARISÉES

Humacyte® Lawson et al.

- Prothèse vasculaire acellulaire humaine (HAVG): collagène humain et autres protéines MEC

- A partir de l'implantation:

colonisation par des cellules de l'hôte + remodelage = structure vasc histologiquement similaire à composition d'un vaisseau natif

- Etude de phase III multicentrique randomisée comparant HAVG vs ePTFE 2023 (Wang et al. JVS Vasc Sci.)

- moins d'infection à 1 an : 0.93% vs 4.54 ePTFE ($P = .0413$)

Lawson et al. Lancet 2016
Wang et al. Biomater Sci 2017

ePTFE / FAV autologue

HAS

Rapport 2021

- **Prévalence des pontages en France**
 - 2018 : 2.8% (FAV 77.6% / Kt: 18.8 %) – HAS 2021
 - 2021 : 2% (FAV autologue 74% / Kt 23%))- *Registre REIN 2021*

1. Fistules artério-veineuses natives / autologues

- **1ere intention**
- Meilleure perméabilité
- Taux de complications inférieur

Quelle est la place des PTFE / autres substituts vasculaires ?

AVANTAGES DES ePTFE vs AUTRES MATERIAUX

- Durabilité
- Compatibilité avec le corps humain
- Bonne tolérance
- Bonne résistance aux infections
- Bonne résistance aux thromboses

SUBSTITUTS VASCULAIRES

Choix

Synthétique / biologique / mixte

- Matériau biologiquement inerte
- Bonnes propriétés biomécaniques
 - Compliance
 - Pression à l'éclatement
 - R aux sutures
 - Porosité
- Moins cher
- Facilement accessible
- Perméabilité / R infections

SUBSTITUTS VASCULAIRES

ePTFE

- Matériau biologiquement inerte ✓
- Bonnes propriétés biomécaniques ✓
- Moins cher ✓
- Facilement accessible ✓
- Perméabilité / R infections / dégénérescence tardive ✓

CONCLUSION

OUI

PTFE GARDE UNE PLACE IMPORTANTE AUJOURD'HUI

- En 2eme intention après FAV native
- Qqfois en 1^{ère} intention
 - Ø utilisation des vaisseaux propres du patient
 - EV limitée – âge / comorbidités / facteurs de risque
- **Avantages**
 - Pas de maturation
 - Utilisation rapide : à partir de 24 h après création
 - Fiable et efficace
- **Futur** : biomatériaux / biotechnologie innovante

Reste-t-il une place en France pour les PTFE ?

OUI

Merci de votre attention